

خرید کتاب های کنکور

با تخفیف ویژه

ارال رایگان

Medabook.com



مدابوک




پک جامه ناس تلفنی، رایگان

با هشاوران رتبه برتر


برای انتخاب بهترین منابع

دبیرستان و کنکور

۰۲۱ ۳۸۴۳۵۲۱۰



- راههای عبور مواد از غشا:** ۱) عبور از فضای بین مولکول‌های لیپیدی؛
۲) عبور با کمک مولکول‌های پروتئینی
■ مواد با فرایندهای ویژه‌ای از غشای یاخته عبور می‌کنند.



ورود مواد به یاخته و خروج از آن

■ به ۵ روش زیر می‌باشد:

(۱) انتشار ساده


تعريف «انتشار ساده»: جریان مولکول‌ها از جای بروغلهظت به جای کم‌غلظت (در جهت شیب غلهظت) می‌باشد.

نتیجه انتشار ساده: یکسان شدن غلهظت آن ماده در دو سوی غشاست.

دلیل و اساس انجام انتشار ساده (بر اساس انرژی): مولکول‌ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی می‌توانند منتشر شوند. بنابراین در این روش، یاخته، انرژی مصرف نمی‌کند.


مثال: اکسیژن و کربن دی‌اکسید با این روش از غشا عبور می‌کنند.

نکته: با گذشت زمان سرعت انتشار ساده، کمتر می‌شود.



(۲) انتشار تسهیل شده

چکونگی انجام انتشار تسهیل شده: پروتئین‌های غشا، انتشار مواد را تسهیل می‌کنند و مواد را در جهت شیب غلهظت آن‌ها از غشا عبور می‌دهند.



(۳) گذرندگی (اسمز)

تعريف «گذرندگی»: به انتشار آب از غشای با تراوایی نسبی (نفوذپذیری انتخابی)، گذرندگی (اسمز) می‌گویند.

فصل ۲ یاخته و بافت جانوری

■ غذایی که می‌خوریم، در گذر از دستگاه گوارش، می‌تواند ۱) مواد و انرژی لازم برای سالم ماندن، ۲) درست عمل کردن و ۳) رشد و نمو یاخته‌های بدن را فراهم کند.


■ مصرف غذای اضافه بر نیاز، اضافه وزن و چاقی را به دنبال دارد که سلامت جمعیت کنونی و آینده ما را به خطر می‌اندازد.

یاخته

تعريف «یاخته»: واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است.

■ یاخته‌های بدن انسان، به شکل بافت‌های مختلف، سازمان یافته‌اند.

■ فضای بین یاخته‌ها را مایع بین یاخته‌ای پر کرده است.



مایع بین یاخته‌ای

■ مایع بین یاخته‌ای، محیط زندگی یاخته‌های است.

وظیفه مایع بین یاخته‌ای: یاخته‌ها مواد لازم (اکسیژن و مواد مغذی) را از این مایع دریافت می‌کنند و مواد دفعی (کربن دی‌اکسید) را به آن می‌دهند تا به کمک خون از بدن دفع شوند.

■ ترکیب مواد در مایع بین یاخته‌ای، شبیه خوناب (پلاسمما) است.

■ مایع بین یاخته‌ای به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می‌کند.

غضای یاخته

■ غشای یاخته، سدی است که مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از این سد عبور کنند.

ویژگی مهم غشا: نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد؛ یعنی: فقط برخی از مولکول‌ها و یون‌ها می‌توانند از غشا عبور کنند.


مولکول‌های سازنده غشا: ۱) لیپید، ۲) پروتئین و ۳) کربوهیدرات.

ویژگی‌های بخش لیپیدی غشا:

۱) دارای مولکول‌هایی بنام فسفولیپید و کلسترول

۲) قرار گرفتن مولکول‌های فسفولیپید در دو لایه

چگونگی انجام درونبری و بروونرانی: با تشکیل کیسه‌های غشایی همراه است و به انرژی ATP نیاز دارد.



بافت‌های جانوری

آنواع بافت‌های اصلی بدن انسان، چهار نوع می‌باشد: ۱) بافت پوششی، ۲) بافت پیوندی، ۳) بافت ماهیچه‌ای و ۴) بافت عصبی این چهار نوع بافت، از یاخته‌ها و مواد موجود در فضای بین یاخته‌ها تشکیل می‌شوند.

آنواع بافت‌ها به نسبت‌های مختلف در اندامها و دستگاه‌های بدن وجود دارند.

(۱) بافت پوششی


وظیفه: سطح بدن (پوست) و سطح حفره‌ها و مجرای درون بدن (مانند دهان، معده، روده‌ها و رگ‌ها) را می‌پوشاند.

ویژگی: یاخته‌های آن به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند و بین آن‌ها فضای بین یاخته‌ای اندکی وجود دارد.

شكل‌های مختلف یاخته‌های بافت پوششی: ۱) سنگفرشی، ۲) مکعبی و ۳) استوانه‌ای؛ هر کدام در یک یا چند لایه سازمان می‌یابند.

مثال: ۱) دهان و مری: دارای بافت پوششی سنگفرشی چندلایه‌ای روده و معده؛ دارای بافت پوششی استوانه‌ای یک‌لایه‌ای

نتیجه: در بخش‌های مختلف لوله‌گوارش، بافت پوششی به شکل‌های ۱) سنگفرشی و ۲) استوانه‌ای وجود دارد.



غشای پایه

محل: در زیر یاخته‌های بافت پوششی قرار دارد.

وظیفه: یاخته‌های بافت پوششی را به یکدیگر و به بافت‌های زیر آن، متصل نگه می‌دارد.

ساختار: شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی (ترکیب کربوهیدرات و پروتئین) می‌باشد.


در گذرندگی، فقط آب جایه‌جا می‌شود.

تعريف «فسار اسمزی محلول»: فشار لازم برای توقف کامل اسمز است.

عامل مؤثر بر سرعت اسمز: هرچه اختلاف غلظت آب در دو سوی غشا بیش‌تر باشد، فشار اسمزی بیش‌تر است و آب سریع‌تر جایه‌جا می‌شود.

در بدن ما ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز، موجب ترکیدن یاخته‌ها نمی‌شود؛ **علت:** فشار اسمزی مایع اطراف یاخته‌ها، تقریباً مشابه درون آن‌هاست. در نتیجه آب بیش از حد وارد نمی‌شود و به طور معمول، یاخته‌ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می‌شوند.

در شکل زیر، در یک طرف غشای نازکی که نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد، آب خالص و در طرف دیگر آن، محلول شکر وجود دارد. فقط مولکول‌های آب می‌توانند از غشا عبور کنند؛ در این حالت، تعداد مولکول‌های آب در سمت راست بیش‌تر است و این مولکول‌ها بیش‌تر به سمت چپ منتشر می‌شوند. در دو طرف این غشا، غلظت آب متفاوت است و در اثر این اختلاف غلظت، جایه‌جایی خالص آب رخ می‌دهد. در اثر اسمز، حجم محلول سمت چپ افزایش می‌یابد.




۴) انتقال فعال

تعريف «انتقال فعال»: فرایندی است که در آن، یاخته مواد را برخلاف شبی غلظت (از جای کم‌غلظت به جای بغلظت) منتقل می‌کند.

چگونگی انجام انتقال فعال: مولکول‌های پروتئین در غشای یاخته با صرف انرژی، ماده‌های را برخلاف شبی غلظت منتقل می‌کنند. این انرژی می‌تواند از مولکول ATP به دست آید. **نتیجه:** در روش انتقال فعال، یاخته انرژی (ATP) مصرف می‌کند.


یاخته‌ها می‌توانند انرژی را در مولکول‌های ویژه‌ای از جمله مولکول ATP ذخیره کنند. وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد، پیوندهای پر انرژی مولکول ATP را می‌شکند و از انرژی آزادشده استفاده می‌کند.



۵) درونبری (آندوسیتوز) و بروونرانی (اگزوسیتوز)

تعريف: بعضی یاخته‌ها می‌توانند ذره‌های بزرگ را با فرایند بروونرانی از یاخته خارج کنند و ذره‌های بزرگ را با فرایند بروونرانی از یاخته داخل کنند.


مثال: (بافت پیوندی متراکم) در زردپی، رباط و بخش‌هایی از قلب وجود دارد.



پ) بافت چربی


نوعی بافت پیوندی است که در آن یاخته‌های سرشار از چربی فراوان است.

وظیفه بافت چربی: ۱) بزرگترین ذخیره انرژی در بدن است. ۲) در کف دستها و پاها، نقش ضربه‌گیری دارد و ۳) به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می‌کند.



۳) بافت ماهیچه‌ای

انواع: آ) مخطط (اسکلتی)، ب) قلبی و پ) صاف



:فعالیت:

ساختار و چگونگی کار انواع ماهیچه‌های بدن را در یک جدول فهرست کنید.


صف	قلبی (مخطط)	اسکلتی (مخطط)	نوع ماهیچه
دوکی شکل	منشعب	رشته‌ای (بدون انشعاب)	شکل یاخته
تک هسته‌ای	بیش تر تک هسته‌ای و بعضی دو هسته‌ای	چند هسته‌ای	تعداد هسته
سفید - صورتی	قرمز	قرمز	رنگ
دیواره دستگاه گوارش، رحم و ...	قلب	سراسر بدن	محل
غیرارادی	غیرارادی	ارادی	نحوه عملکرد
خودمختار	خودمختار	پیکری	نحوه عصب‌دهی

بافت پوششی غده‌ای

بافت پوششی در برخی از بخش‌های بدن، غده تشکیل می‌دهد.

مثال: ۱) در غده‌های براقی، یاخته‌های پوششی، براق را می‌سازند و به درون مجرایی که به دهان راه دارند، ترشح می‌کنند.

۲) معده و روده نیز غده‌ها و یاخته‌های ترشحی از نوع بافت پوششی دارند که موادی را می‌سازند و به فضای درون این اندام‌ها ترشح می‌کنند.



(ب) بافت پیوندی

ساختار: از انواع یاخته‌ها، رشته‌های پروتئینی به نام رشته‌های کلاژن و رشته‌های کشسان (ارتجاعی) و ماده زمینه‌ای که یاخته‌های این بافت، آن (ماده زمینه‌ای) را می‌سازند، تشکیل شده است.

وظیفه: یاخته‌ها و بافت‌های مختلف را به هم پیوند می‌دهد.

انواع: ۱) نوع دارد که از نظر ۱) مقدار رشته‌ها، ۲) نوع رشته‌ها و ۳) ماده زمینه‌ای متفاوت هستند.

انواع بافت پیوندی

۶) نوع دارد:


(آ) بافت پیوندی سست، ب) بافت پیوندی متراکم (رشته‌ای)، پ) بافت چربی، ت) خون، ث) استخوان و ج) غضروف

(آ) بافت پیوندی سست

ویژگی‌ها: انعطاف‌پذیر است؛ ماده زمینه‌ای آن، سست، شفاف، بی‌رنگ، چسبنده و محلولی از انواع مولکول‌های درشت مانند گلیکوپروتئین است.

وظیفه: معمولاً بافت پوششی را پشتیبانی می‌کند.

مثال: در زیر بافت پوششی لوله گوارشی، یک لایه بافت پیوندی سست قرار دارد.



یاخته‌های بافت پیوندی

(بافت پیوندی سست)

(ب) بافت پیوندی متراکم (رشته‌ای)

ویژگی‌ها: میزان رشته‌های کلاژن آن از بافت پیوندی سست، بیش تر، تعداد یاخته‌های آن کمتر و ماده زمینه‌ای آن نیز اندک است. مقاومت این بافت از بافت پیوندی سست بیش تر، ولی انعطاف‌پذیری آن کمتر است.

۴- در طرف مقابل تخم مرغ، سوراخی به اندازه قطر نی ایجاد کنید و نی را تا ۲/۵ سانتی متر درون سوراخ و غشای نازک زیر آن فرو ببرید.

۵- فضای بین نی و پوسته تخم مرغ را با خمیر بازی پر کنید.

۶- طرف را یک شب در جای مناسبی قرار دهید و پس از آن، تغییرات درونی نی را مشاهده کنید.

۷- مشاهده های خود را یادداشت کنید و در صورت امکان از آن ها عکس تهیه کنید.

توضیح دهید چرا مایع درون نی حرکت می کند؟

پاسخ: غشای تخم مرغ مانند پرده نیمه تراوا عمل می کند و آب درون نی به علت اسمز، بالا می رود.

ب) اگر پوسته آهکی یک تخم مرغ را با قرار دادن آن در سرکه از بین ببریم و تخم مرغ بدون پوسته را یک بار در آب مقطور و باز دیگر در محلول نمک غلیظ قرار دهیم، پیش بینی کنید چه تغییری در تخم مرغ ایجاد می شود؟ با توجه به آن چه آموختید برای پیش بینی خود دلیل بیاورید.

پاسخ: درون آب مقطور، تخم مرغ متورم می شود و در آب نمک غلیظ، چروکیده می شود. علت این پدیده، اسمز می باشد.


نکته فعالیت: اگر پوسته آهکی یک تخم مرغ را با قرار دادن آن در سرکه از بین ببریم؛ آ) اگر تخم مرغ؛ بدون پوسته را در آب مقطور قرار دهیم، آب به روش اسمز وارد تخم مرغ می شود تخم مرغ، باد کرده و سفت می شود. و ب) اگر تخم مرغ بدون پوسته را در محلول نمک غلیظ قرار دهیم، آب به روش اسمز از تخم مرغ خارج و وارد محلول می شود (تخم مرغ، چروکیده و کوچک می شود).

۴) بافت عصبی

■ یاخته های اصلی آن، یاخته های عصبی (نورون ها) هستند.

■ یاخته های عصبی با یاخته های دیگر مانند یاخته های ماهیچه ارتباط دارند.

■ یاخته های عصبی، یاخته های ماهیچه را تحريك می کنند تا منقبض شوند.



فعالیت:

الف) در این فعالیت با چگونگی اسمز از پرده ای با تراوایی نسبی آشنا می شوید.

وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه ای (یا بشر) با دهانه کوچک، مقداری آب مقطور (یا آب جوشیده سرد شده)، نی نوشابه خوری شفاف، تخم مرغ خام، مقداری خمیر بازی، قاشق فلزی

روش کار:

۱- $\frac{3}{4}$ ظرف شیشه ای را آب بریزید.

۲- با لبه قاشق، به انتهای مدور تخم مرغ آهسته ضربه بزنید و با ناخن تکه کوچکی به اندازه نوک انگشت از پوسته آهکی را جدا کنید. مراقب باشید که پرده نازک زیر پوسته آسیب نبیند.

۳- تخم مرغ را روی ظرف شیشه ای قرار دهید، طوری که پوسته نازک آن با آب در تماس باشد.

بخش های سازنده غشا

ویرگی	انواع	
در دو لایه قرار گرفته است. فراوان ترین مولکول غشای یاخته است. در صورت اتصال به کربوهیدرات، گلیکولیپید را تشکیل می دهد.	۱) فسفولیپید ۲) کلسترول	بخش لیپیدی
در لابه لای مولکول های فسفولیپید وجود دارد. فقط در یک سطح غشا قرار گرفته اند.	۱) سطحی	بخش پروتئینی
از هر دو سطح غشا عبور می کنند؛ انواع کاتالی و ناقل دارند.	۲) سراسری	
در صورت اتصال پروتئین به کربوهیدرات، تشکیل می شود.	۳) گلیکوپروتئین	

انواع روش‌های جایه‌جایی مواد از غشای یاخته (بر اساس اندازه)							
ذره‌های بزرگ		ذره‌های کوچک					
برون‌رانی	درون‌بری	انتقال فعال	انتشار			انتشار ساده	حرکت بر اساس شیب غلظت
			انتشار تسهیل شده	اسمز	انتشار ساده		
-	-	خلاف جهت شیب غلظت	در جهت شیب غلظت	در جهت شیب غلظت	در جهت شیب غلظت	در جهت شیب غلظت	حرکت بر اساس شیب غلظت
دارد	دارد	دارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	صرف انرژی زیستی (ATP)
-	-	ناقل	کانال حامل	-	-	-	نوع پروتئین جایه‌جاینده
کربوهیدرات، پروتئین، کیلومیکرون، ویتامین B ₁₂ و ترشح برازق	برخی مولکول‌ها و مواد معدنی مانند: سدیم، پتاسیم؛ کلسیم و آهن	گلوکز اغلب آمینو اسیدها	مولکول‌های آب	CO ₂ , O ₂ مواد معدنی (یون‌ها)	مواد عبوری		

مثال	انواع بافت پوششی
دیواره مویرگ‌ها، لایه خارجی کپسول بومن در کلیه‌ها، دیواره حبابک‌ها در شش‌ها	سنگ‌فرشی یک لایه (ساده)
غدهٔ تیروئید، لوله‌های گردیزه در کلیه	مکعبی یک لایه
روده، معده، انتهای بینی، نای تا نایزک‌های مبادله‌ای	استوانه‌ای یک لایه
پوست، مری، ابتدای بینی، دهان	سنگ‌فرشی چند لایه
غدد برازقی، غدد معده، یاخته‌های ترشح‌کننده هورمون در روده	غده‌ای

مقایسهٔ بافت پوششی با بافت پیوندی		
پیوندی	پوششی	نوع بافت
زیاد	کم	فضای بین یاخته‌ای
مقدار آن در بافت‌های مختلف، متفاوت است.	کم	مادهٔ زمینه‌ای
ندارد	دارد	وجود غشای پایه در زیر یاخته‌های آن
اتصال یاخته‌ها و بافت‌های مختلف به هم، ذخیره انرژی، ضربه‌گیری و عایق حرارتی	پوشش سطح بدن، سطح داخلی حفره‌ها و سطح داخلی مجاري	وظيفه
مواد به‌کار رفته در مادهٔ زمینه‌ای	شكل یاخته و تعداد لایه‌های آن	اساس طبقه‌بندی
ندارد	دارد	توانایی جذب

سوالات

چهارخانه

- واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران، است.
- ترکیب مواد در مایع بین یاخته‌ای، شبیه است.
- سدی که مواد گوناگون برای ورود به یاخته باید از آن عبور کنند، نام دارد.
- در گذرندگی، فقط جایه‌جا می‌شود.
- عامل مؤثر بر سرعت اسmer، در دو سوی غشا است.
- انرژی مورد نیاز برای فرایند انتقال فعال، از مولکول به دست می‌آید.
- بافت ، سطح حفره‌ها و مجاری درون بدن را می‌پوشاند.
- بافت پوششی گردیزه از نوع و لایه‌ای می‌باشد.
- ، نوعی بافت پیوندی است که انعطاف‌پذیر می‌باشد و معمولاً بافت پوششی را پشتیبانی می‌کند.
- مقدار رشته‌های کلژن بافت پیوندی متراکم، از بافت پیوندی سست است و ماده زمینه‌ای بافت پیوندی متراکم، است.
- بزرگ‌ترین ذخیره انرژی در بدن، مربوط به بافت است.
- خون، غضروف، از انواع بافت‌های می‌باشد.

نحوه و ماقبه

- همواره فضای بین یاخته‌ها را (خوناب - مایع بین یاخته‌ای) پر کرده است.
- یاخته‌ها مواد لازم مانند (اکسیژن - کربن دی اکسید) را از مایع بین یاخته‌ای دریافت می‌کنند.
- از ویژگی‌های مولکول‌های فسفولیپید غشا، قرار گرفتن آن‌ها در (یک - دو) لایه است.
- جریان مولکول‌ها از جای پرغلاظت به جای کم‌غلاظت (انتشار ساده - انتقال فعال) می‌باشد.
- هرچه اختلاف غلاظت آب در دو سوی غشا (کمتر - بیشتر) باشد، فشار اسمزی، بیش‌تر است و آب (کندتر - سریع‌تر) جایه‌جا می‌شود.
- در روش (انتشار ساده - انتقال فعال)، یاخته انرژی مصرف می‌کند.
- بین یاخته‌های بافت پوششی، فضای بین یاخته‌ای (اندکی - زیادی) وجود دارد.
- دیواره مویرگ، دارای بافت پوششی سنگفرشی (یک - چند) لایه‌ای می‌باشد.
- سطح درونی روده، دارای بافت پوششی (مکعبی - استوانه‌ای) (یک - چند) لایه‌ای می‌باشد.
- در غده‌های بزاقی، یاخته‌های (پوششی - پیوندی)، بزاق را می‌سازند.
- (چهار - شش) نوع بافت پیوندی وجود دارد.
- بافت پیوندی (سست - متراکم)، در زیر بافت پوششی لوله‌گوارش قرار دارد.
- در بخش‌هایی از قلب، بافت پیوندی (سست - متراکم) وجود دارد.
- یاخته‌های (عصبی - ماهیچه)، یاخته‌های (عصبی - ماهیچه) را تحریک کرده تا منقبض شوند.

درست‌ترین نادرست

- خوناب، محیط زندگی همه یاخته‌هاست.
- به دلیل نفوذپذیری غشای یاخته، همه مولکول‌ها و یون‌ها می‌توانند از آن عبور کنند.
- در روش انتشار ساده، مولکول‌ها در جهت شیب غلظت، منتشر می‌شوند.
- عبور اکسیژن به درون یاخته، به روش انتشار تسهیل شده می‌باشد.
- در بدن ما ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز، موجب ترکیدن یاخته نمی‌شود.
- در روش انتقال فعال، مولکول‌های پروتئین در غشای یاخته با صرف انرژی، ماده‌ای را برخلاف شیب غلظت منتقل می‌کنند.
- فرایند درون‌بری با تشکیل کیسه‌های غشایی همراه است و بدون نیاز به انرژی ATP انجام می‌شود.
- انواع بافت‌ها به یک نسبت در اندامها و در دستگاه‌های بدن وجود دارند.
- یاخته‌های بافت پوششی، بسیار از هم دور هستند.
- سطح درونی مری، توسط بافت پوششی سنگفرشی چندلایه‌ای پوشیده شده است.
- در زیر یاخته‌های بافت پوششی، غشای پایه قرار دارد.
- یاخته‌های اصلی بافت عصبی، یاخته‌های عصبی هستند.

تعریف دنبیم

۴۱- فشار اسمزی

۴۰- گذرندگی


۳۹- یاخته

پاسخ صحیح

- ۴۲- این موضوع که غشا تراوایی نسبی دارد، به چه معنی است؟
 ۴۳- سه مولکول سازنده غشا را نام ببرید.
 ۴۴- دو راه عبور مواد از غشا را نام ببرید.
 ۴۵- نتیجه انتشار ساده چیست?
 ۴۶- به چه علت در بدن ما ورود آب به درون یاخته‌ها در اثر اسمز، موجب ترکیدن یاخته‌ها نمی‌شود؟
 ۴۷- وظیفه غشای پایه چیست?
 ۴۸- ساختار غشای پایه را بنویسید.
 ۴۹- انواع بافت‌های پیوندی، از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ (سه مورد را ذکر کنید).
 ۵۰- سه مورد از وظایف بافت چربی را بنویسید.
 ۵۱- انواع بافت‌های پیوندی را نام ببرید.
 ۵۲- سه نوع بافت ماهیچه‌ای را نام ببرید.

سوالات شدید


۵۳- در هریک از شکل‌های زیر، مواد به چه روشی از غشای یاخته عبور می‌کنند؟



۵۴- نوع هریک از بافت‌های پوششی زیر را با ذکر مثال بنویسید.




۵۵- نوع هریک از بافت‌های پیوندی زیر را بنویسید.



۵۶- نوع هر یک از بافت‌های ماهیچه‌ای زیر را بنویسید.



۵۷- در یاخته عصبی زیر، موارد (آکسون، دندریت، جسم یاخته‌ای و جهت پیام عصبی) را مشخص کنید.




سوالات تست

- ۵۸- یاخته‌ها اکسیژن مورد نیاز خود را مستقیماً از می‌گیرند و غشای یاخته‌های جانوری، نفوذپذیری کامل
- (۱) خون - دارد (۲) مایع بین‌یاخته‌ای - دارد (۳) خون - ندارد (۴) مایع بین‌یاخته‌ای - ندارد
- ۵۹- بیشترین تعداد مولکول‌های سازنده غشا، در لایه قرار گرفته‌اند و در روش ، مواد از لایه‌لای این مولکول‌ها جابه‌جا می‌شوند.
- (۱) یک - انتشار ساده (۲) دو - انتشار ساده (۳) یک - انتشار تسهیل شده (۴) دو - انتشار تسهیل شده
- ۶۰- در کدام‌بک از روش‌های عبور مواد از غشای یاخته، با وجود مصرف انرژی، مولکول‌های ناقل نقشی ندارند؟
- (۱) انتشار تسهیل شده (۲) انتقال فعال (۳) بروون رانی (۴) اسمز
- ۶۱- غشای پایه،
- (۱) یاخته‌های همه بافت‌های اصلی بدن انسان را به هم متصل می‌کند. (۲) حاوی یاخته‌های مملو از پروتئین می‌باشد. (۳) یاخته‌های پوست را به بافت پیوندی سست متصل می‌کند. (۴) حاوی مواد لیپیدی است.
- ۶۲- بافت پیوندی موجود در زردبی، دارای کدام ویژگی زیر است؟
- (۱) انعطاف‌پذیری زیاد دارد. (۲) مقاومت کمی دارد. (۳) مادة زمینه‌ای فراوان دارد. (۴) تعداد یاخته‌های کمی دارد.

بیان سؤالات

۱	یاخته
۲	خوناب (پلاسمایا)
۳	غشای یاخته
۴	آب
۵	اختلاف غلظت آب
۶	ATP
۷	پوششی
۸	مکعبی - یک
۹	بافت پیوندی سست
۱۰	بیشتر - اندک
۱۱	چربی
۱۲	همانند - پیوندی
۱۳	مایع بین‌یاخته‌ای
۱۴	اکسیژن
۱۵	دو
۱۶	انتشار ساده
۱۷	بیشتر - سریع تر
۱۸	انتقال فعال
۱۹	اندکی
۲۰	یک
۲۱	استوانه‌ای - یک
۲۲	پوششی
۲۳	نشش
۲۴	سست
۲۵	متراکم
۲۶	عصبی - ماهیچه
۲۷	نادرست - مایع بین‌یاخته‌ای، محیط زندگی همه یاخته‌های است.
۲۸	نادرست - به دلیل نفوذپذیری انتخابی غشای یاخته، فقط برخی از مولکول‌ها و یون‌ها می‌توانند از آن عبور کنند.
۲۹	درست
۳۰	نادرست - عبور اکسیژن به درون یاخته، به روش انتشار ساده می‌باشد.
۳۱	درست
۳۲	درست
۳۳	نادرست - فرایند درون‌بری، به انرژی ATP نیاز دارد.
۳۴	نادرست - انواع بافت‌ها به نسبت‌های مختلف در اندام‌ها و دستگاه‌های بدن وجود دارند.
۳۵	نادرست - یاخته‌های بافت پوششی، به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند.
۳۶	درست
۳۷	درست
۳۸	درست
۳۹	یاخته، واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است.
۴۰	به انتشار آب از درون غشایی با تراوایی نسبی (نفوذپذیری انتخابی)، اسمز می‌گویند.
۴۱	فشار لازم برای توقف کامل اسمز، فشار اسمزی نام دارد.
۴۲	يعنی فقط برخی از مولکول‌ها و یون‌ها می‌توانند از غشا عبور کنند.
۴۳	(۱) لیپید، (۲) پروتئین و (۳) کربوهیدرات
۴۴	(آ) عبور از فضای بین مولکول‌های لیپیدی و (ب) عبور با کمک مولکول‌های پروتئینی
۴۵	یکسان شدن غلظت آن ماده در دو سوی غشاست.

۵۸ گزینه (۴)، یاخته‌ها مواد لازم (اکسیژن و مواد مغذی) را از مایع بین‌یاخته‌ای دریافت می‌کنند. غشای یاخته، نفوذپذیری انتخابی یا تراویب نسبی (نه کامل) دارد.

۵۹ گزینه (۲)، مولکول‌های فسفولیپید، بیشترین تعداد مولکول‌های سازنده غشای ساخته شده و در دو لایه قرار گرفته‌اند و مولکول‌هایی مانند O_2 و CO_2 به روش انتشار ساده از لایه‌لایی این مولکول‌ها عبور می‌کنند.

۶۰ گزینه (۳)؛ در بین روش‌های عبور مواد از غشای یاخته، روش‌های انتقال فعال، درونبری و بروونرانی، با مصرف انرژی انجام می‌شوند که در انتقال فعال برخلاف دو روش دیگر، پروتئین‌های ناقل نقش دارند.

۶۱ گزینه (۳)؛ غشای پایه، یاخته‌های بافت پوششی (پوست) را به یکدیگر و به بافت‌های زیر آن (بافت پیوندی متراکم) متصل متصل نگه می‌دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) غشای پایه، یاخته‌های بافت پوششی (نه همه بافت‌ها) را به هم متصل می‌کند.

(۲) غشای پایه، یاخته ندارد، زیرا بافت نمی‌باشد.

(۴) غشای پایه، حاوی رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی (نه لیپیدی) است.

۶۲ گزینه (۴)، بافت پیوندی موجود در زردپی، از نوع رشته‌ای (متراکم) می‌باشد. بافت پیوندی متراکم، نسبت به بافت پیوندی سست، رشته‌های کلازن بیشتر، تعداد یاخته‌های کمتر و ماده زمینه‌ای اندکی دارد و مقاومت آن بیشتر ولی انعطاف‌پذیری آن کمتر است.

۴۶ زیرا در بدن ما فشار اسمزی مایع اطراف یاخته‌ها، تقریباً مشابه درون آن هاست، در نتیجه آب، بیش از حد وارد نمی‌شود.

۴۷ غشای پایه، یاخته‌های بافت پوششی را به یکدیگر و به بافت‌های زیر آن، متصل نگه می‌دارد.

۴۸ غشای پایه، شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی می‌باشد.

۴۹ (۱) مقدار رشته‌ها، (۲) نوع رشته‌ها و (۳) ماده زمینه‌ای

۵۰ (۱) بافت چربی، بزرگ‌ترین ذخیره انرژی در بدن است. (۲) در کف دست‌ها و پاهای، نقش ضریب‌گیری دارد. (۳) به عنوان عایق حرارتی عمل می‌کند.

۵۱ (۱) بافت پیوندی سست، (۲) بافت پیوندی متراکم، (۳) بافت چربی، (۴) خون، (۵) استخوان و (۶) غضروف

۵۲ (۱) مخطط (اسکلتی)، (۲) قلبی و (۳) صاف

۵۳ (آ) انتقال تسهیل شده، (ب) انتقال فعال، (پ) بروونرانی و (ت) درونبری

۵۴ (آ) سنگفرشی یکلایه‌ای (دیواره موبیگ)، (ب) مکعبی یکلایه‌ای (گردیزه / نفرون)، (پ) سنگفرشی چندلایه‌ای (مری) و (ت) استوانه‌ای یکلایه‌ای (روده)

۵۵ (آ) بافت پیوندی سست، (ب) بافت پیوندی متراکم و (پ) بافت چربی

۵۶ (آ) ماهیچه اسکلتی، (ب) ماهیچه قلبی و (پ) ماهیچه صاف

۵۷

